

## **INSTRUCCIÓ PAUTA VACUNAL AUJESZKY ALS ENGREIXOS TOT DINS – TOT FORA:**

Al "Programa de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky de 2009", a la pàgina 5 del document B, hi ha la pauta de vacunació, serologia i establiment de prevalences per a les explotacions d'engreix.

El programa vacunal general per a les explotacions d'engreix amb sistema Tot dins -Tot fora estableix que han de realitzar-se dues vacunacions obligatòries com a **mínim** durant el període d'engreixada, amb excipient oliós (una entre les 10 i 12 setmanes de vida i la següent entre 3 i 4 setmanes després de la primera). També estableix que els animals d'engreix es tornaran a vacunar als 6 mesos d'edat.

També s'estableix que si les explotacions es troben en zones de risc de reinfecció el programa vacunal general s'intensifica amb una tercera vacunació entre 3 i 4 setmanes després de la segona (aquesta tercera amb diluent oliós o aquós).

S'ha constatat que la vacunació dels 6 mesos de vida, a la pràctica no s'aplica ja que en general a aquesta edat els porcs ja estan sortint cap a escorxador i els productors ja disposen del TDSE.

Per altra banda, tenint en compte que actualment no tenim zones de risc de reinfecció a Catalunya relacionats amb focus existents però si que rebem garrins d'altres CCAA que encara no tenen la qualificació d'indemnes, i atenent a l'article 4 del RD 360/2009 pel qual s'estableixen les bases del programa coordinat de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky, es convenient intensificar el programa vacunal dels engreixos Tot dins -Tot fora en determinades zones del territori que s'indiquen a continuació:

- **Engreixos de totes les comarques de la província de Lleida** (atenent la densitat ramadera, que és la última demarcació que ha tingut focus de la malaltia i que s'hi engreixen molts garrins provinents d'altres CCAA).
- Engreixos de les Demarcacions Territorials de Barcelona, Girona, Tarragona o Terres de l'Ebre que també rebin garrins originaris de altres CCAA o que se'ls hi hagi detectat incompliment del programa vacunal general.
- Engreixos de les Demarcacions Territorials de Barcelona, Girona, Tarragona o Terres de l'Ebre que per altres circumstàncies específiques de risc valorades pel Servei de Sanitat Animal ho facin oportú .



En aquestes zones, doncs, el programa vacunal obligatori s'intensifica i es el següent:

- 1<sup>a</sup> vacunació oliosa a les 10-12 setmanes de vida.
- 2<sup>a</sup> vacunació oliosa a les 3-4 setmanes de la 1<sup>a</sup> vacunació.
- 3<sup>a</sup> vacunació oliosa o aquosa a les 3-4 setmanes de la 2<sup>a</sup> vacunació.
- Revacunació en cas que els animals compleixin els 6 mesos d'edat.

Servei de Sanitat Animal

Barcelona, 15 de març de 2010