

## **INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA PER AL MANTENIMENT DE LA QUALIFICACIÓ D'INDEMNÈ D'AUJESZKY:**

Al "Programa de lluita, control i eradicació de la malaltia d'Aujeszky de 2009", al seu Annex 1 del document B, hi ha una instrucció per a l'obtenció, manteniment i suspensió de la qualificació d'indemne d'Aujeszky. L'apartat "Suspensió i recuperació de la qualificació" d'aquest Annex indica en el seu primer apartat el procediment a seguir en cas que apareguin animals clínicament malalts o serològicament positius a gE, i quan es comprova que no s'ha complert el programa vacunal.

### **Resultats positius a gE en explotacions de reproductores:**

Amb la norma actual quan en una analítica de sanejament sortia **1 truja +/D d'Aujeszky** es procedia a la seva identificació i posterior sacrifici, i als 30 dies d'aquest es procedia a fer a l'explotació una taula 95/5. Aquesta actuació ens provocava que entre que la truja estava gestant i en molts casos per benestar animal no podia portar-se a l'escorxador fins després del part i lactació transcorrien entre 2 i 3 mesos fins que disposàvem de resultats de l'estudi complementari. A la pràctica aquesta actuació s'ha demostrat efectiva, però actualment la situació epidemiològica ha variat substancialment i es convenient actualitzar-la donat que ja no hi ha explotacions positives, amb la finalitat de poder disposar dels resultats de l'estudi complementari en 2-3 dies.

### **Nova pauta d'actuació:**

A partir de la divulgació de la present instrucció, **en cas d'aparició d'1-2 +/D** en un sanejament es procedirà tal com s'especifica tot seguit:

1. **Comunicació immediata a l'ADS/GSP per tal que la truja s'identifiqui amb el cròtal verd i repetició urgent (mateix dia o l'endemà) d'aquest animal i dels del seu entorn (truges dels boxes de davant i del costat, truges del mateix parc o lot, truges en contacte). Es determina suficient fer un total de 16 mostres entre la +/D i el seu entorn.** En procedir de forma ràpida a fer aquesta serologia complementària els animals de l'explotació encara es troben en el mateix ordre, la qual cosa facilita poder sagnar el seu entorn. Amb aquesta pauta als 3 dies podem tenir els resultats inicials del sanejament i els de l'estudi complementari i diagnosticar l'abast epidemiològic dins l'explotació.



## 2. Valoració de resultats de l'estudi complementari:

2.1 - Si tot dona negatiu es sacrifica la +/D de l'anàlisi inicial i s'acaba l'actuació.

2.2 - Si tot dona negatiu excepte la que era +/D es procedeix al sacrifici immediat d'aquest animal (escorxador o sacrifici sanitari a l'explotació amb T-61) i als 30 dies es realitza una taula 95/5 a l'explotació.

2.3 - Si surten animals positius diferents als anteriors es procedeix al sacrifici immediat dels +/D (escorxador o sacrifici sanitari a l'explotació amb T-61), es perd la qualificació i cal iniciar el procés de requalificació.

Servei de Sanitat Animal

Barcelona, 15 de març de 2010